


গুণগত রসায়ন

Zahid Sir

Part -2



ହାରତ୍ତ + ଲାଲ୍‌ଟ ଉପନ ସମୀକରଣ:



ସାମାନ୍ୟ ହାରତ୍ତ:

100g ହାରତ୍ତ ପଦାର୍ଥର ହାରତ୍ତ ହାରତ୍ତ ଉପନ ସମୀକରଣ ସଫୁଟ ସଫୁଟ
ଗଂ. ହାରତ୍ତ ହାରତ୍ତ ହାରତ୍ତ,

20°C ତାପମାତ୍ରାରେ $NaCl$ ହାରତ୍ତ ହାରତ୍ତ 36 ସଫୁଟ ହାରତ୍ତ?

20°C ତାପମାତ୍ରାରେ 100g ହାରତ୍ତ 36g $NaCl$ ହାରତ୍ତ ଉପନ ସମୀକରଣ ସଫୁଟ ସଫୁଟ,

* ସାମାନ୍ୟ,

$$\text{ସମସ୍ତତ୍ତ୍ୱ} = M$$

$$\text{ସମସ୍ତତ୍ତ୍ୱ} = m$$


$$\therefore \text{ସମସ୍ତତ୍ତ୍ୱ} = M - m$$

$$\therefore M - m \text{ g ସମସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ମିଶ୍ରଣ}$$

$$\therefore 1 \text{ g " " " } \frac{m}{M - m}$$

$$\therefore 100 \text{ g " " " } \frac{100m}{M - m}$$

$$\therefore \text{ସମସ୍ତତ୍ତ୍ୱ} \boxed{S = \frac{100m}{M - m}} = \left(\frac{\text{ସମସ୍ତତ୍ତ୍ୱ}}{\text{ସମସ୍ତତ୍ତ୍ୱ}} \times 100 \right)$$


$$\therefore S = \frac{100m}{M-m}$$

$$\text{वा, } 90 = \frac{100m}{100-m}$$

$$\text{বা, } 90(100 - m) = 100m$$

বা, $900 - 9m = 10 \text{ m}$

বা, $19m = 900$

$$\therefore m = 47.37 \text{ গ্রাম}$$

$\therefore$ দ্রাবকের ভর, $(M - m) = (100 - 47.37)$ গ্রাম = 52.63 গ্রাম

আবার, 30°C তাপমাত্রায় দ্রবটির দ্রাব্যতা = 80

$$\therefore S = \frac{100m}{M-m}$$

$$\text{वा, } 80 = \frac{100 \times m}{52.63}$$

$$\text{বা, } m = \frac{80 \times 52.63}{100}$$

বা, $m = 42.104$ গ্রাম

এখানে,


দ্রবের দ্রাব্যতা, $S = 80$

দ্রবণের ভর, $(M - m) = 52.63$ গ্রাম

দ্রবের ভর $m = ?$

দ্রাবকের ভর, $(M - m) = ?$

অতএব, 50°C তাপমাত্রার 100 গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণকে 30°C তাপমাত্রায় শীতল করলে $(47.37 - 42.104) = 5.27$ গ্রাম দ্রব কেলাসিত হবে।



* বিদ্যার অধি:প্রেম? পরিমাণ?!

S. Cut: 50°C = 190g / 30°C = 180g

50°C - 30°C → 190 - 180g = 10g

∴ 190g 20% = 10g

∴ 15% = 100g

∴ 100g

$\frac{10 \times 100}{190} = 5.27\%$

২য় কন্স: ওপমান্য ওপমান্য:

⇒ ৪) 25°C এবং 35°C তাপমাত্রায় কোন দ্রবের দ্রাব্যতা যথাক্রমে 40 এবং 60 হলে, 35°C তাপমাত্রার 100g সম্পৃক্ত দ্রবণকে 25°C তাপমাত্রার শীতল করলে কত গ্রাম দ্রব কেলসিত হবে? (12.5g)

⇒ ~~৫~~ ২) 20°C এবং 50°C তাপমাত্রায় কোন দ্রবের দ্রাব্যতা যথাক্রমে 45 এবং 65 হলে, 20°C তাপমাত্রার 200g সম্পৃক্ত দ্রবণকে 50°C তাপমাত্রা করলে কত গ্রাম দ্রব যোগ করা যাবে? (27.58g)

20°C ওপমান্য

$$S = \frac{100m}{M-m}$$

$$\text{or } 45 = \frac{100m}{200-m}$$

$$\text{or } 9000 - 45m = 100m$$

$$\therefore 145m = 9000$$

$$\therefore m = \frac{9000}{145}$$

$$= 62.07g$$

$$S = 45$$

$$M = 200g$$

$$m = ?$$

$$\therefore \text{সম্পৃক্ত দ্রব } M-m = (200 - 62.07)g = 137.93g$$

50°C ওপমান্য

$$S = \frac{100m}{M-m}$$

$$\text{or } 65 = \frac{100m}{137.93}$$

$$\therefore m = \frac{137.93 \times 65}{100}$$

$$= 89.65$$

$$S = 65$$

$$M-m = 137.93$$

$$m = ?$$

$$\therefore \text{যোগ করা দ্রব} = \underline{\underline{27.58g}}$$

লবণ XY



28°C

130g H₂O

সম্পৃক্ত দ্রবণ

উত্তপ্তকরণ

32°C

XY এর

দ্রবণ

XZ

দ্রবণ

১নং দ্রবণ

২নং দ্রবণ

৩নং দ্রবণ

XZ এর $K_{sp} = 4 \times 10^{-11} \text{ mol}^2 \text{L}^{-2}$

[28°C এবং 32°C তাপমাত্রায় XY লবণটির দ্রাব্যতা যথাক্রমে 35 এবং 45]

গ) ২নং দ্রবণকে সম্পৃক্ত করতে কি পরিমাণ অতিরিক্ত দ্রব যোগ করতে হবে- গণনা কর।

গ) 28°C তাপমাত্রায়

$$S = \frac{100 m}{M - m}$$

$$\Rightarrow 35 = \frac{100 m}{130}$$

$$\Rightarrow m = 45.5$$

$$\begin{aligned} \text{দ্রাবকের মান } M - m \\ = 130g \end{aligned}$$

32°C তাপমাত্রায়

$$S = \frac{100 m}{130}$$

$$45 = \frac{100 m}{130}$$

$$\Rightarrow m = 58.5$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{দ্রব যোগ করতে হবে} &= 58.5 - 45.5 \\ &= 13 g \end{aligned}$$

Base:

$Al(OH)_3$ 50% 50% $0.01M$

$\therefore$ 50% $S = 0.01M$

$$[Al^{3+}] = 0.01M$$

$$\begin{aligned}[OH^-] &= [0.01 \times 3] = 0.03M \\ &= (0.03 \times 17) gL^{-1} \\ &= 0.51 gL^{-1}\end{aligned}$$

* $Al(OH)_3$ 50% 50% OH^- 50% $0.51 gL^{-1}$
 $[OH^-] = 3S = 0.51 gL^{-1}$
 $= \frac{0.51}{17} mL^{-1} = 0.03 mL$
 $\therefore S = \frac{0.03}{3} = 0.01 mL$






$$\begin{aligned}\therefore \text{50\% 50\%} &= S \times (3S)^3 \\ (K_{sp}) &= S \times 27S^3 \\ &= 27S^4\end{aligned}$$


$$K_{ip} = [Al^{3+}][OH^-][OH^-][OH^-]$$

Case:

$K_{ip} > K_{sp}$ 50% 50%
 $K_{ip} < K_{sp}$ 50% 50%
 $K_{ip} = K_{sp}$ 50% 50%




ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରକାର:



ଅଃ. ବି. ଥିବା,

or



১০। ১০ম প্রশ্ন ৫ নং ১০ নং :

⇒ ১। 10mL 0.25M FeCl₃ দ্রবণে 1mL 0.5M NH₄OH দ্রবণ যোগ করা হলো। 25°C তাপমাত্রায় Fe(OH)₃ এর দ্রাব্যতার গুণফল

3.98×10^{-38} হলে মিশ্রণে কোন অধঃক্ষেপ পড়বে কিনা?

✍ সমাধান: $\text{FeCl}_3(\text{aq}) + 3\text{NH}_4\text{OH}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{NH}_4\text{Cl}$

মিশ্রণে Fe^{3+} এর প্রকৃত ঘনমাত্রা নির্ণয়,

$$V_1 S_1 = V_2 S_2$$

$$\text{বা, } 10 \times 0.25 = 11 \times S_2$$

$$\text{বা, } S_2 = \frac{10 \times 0.25}{11} = 0.227M$$

মিশ্রণে OH^- এর প্রকৃত ঘনমাত্রা

$$V_1 S_1 = V_2 S_2$$

$$\text{বা, } 1 \times 0.5 = 11 \times S_2$$

$$\therefore S_2 = \frac{0.5}{11} = 0.0454M$$

এখন, $\text{Fe}(\text{OH})_3$ বিয়োজিত হয়ে সাম্যাবস্থা অর্জন করলে, $\text{Fe}(\text{OH})_3 \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + 3\text{OH}^-$

$$\therefore \text{Fe}(\text{OH})_3 \text{ এর আয়নিক গুণফল } K_{\text{ip}} = [\text{Fe}^{3+}][\text{OH}^-]^3 = (0.227)(0.0454)^3 = 2.124 \times 10^{-5}$$

$\therefore \text{Fe}(\text{OH})_3$ এর আয়নিক গুণফল তার দ্রাব্যতা গুণফল অপেক্ষা বেশি, তাই মিশ্রণে $\text{Fe}(\text{OH})_3$ অধঃক্ষেপ পড়বে

এখানে

Fe^{3+} এর প্রাথমিক আয়তন, $V_1 = 10\text{mL}$

Fe^{3+} এর প্রাথমিক ঘনমাত্রা $S_1 = 0.25\text{ M}$

Fe^{3+} পরিবর্তিত আয়তন, $V_2 = 11\text{ mL}$

Fe^{3+} এর পরিবর্তিত ঘনমাত্রা $S_2 = ?$

এখানে

OH^- এর প্রাথমিক আয়তন, $V_1 = 1\text{mL}$


OH^- এর প্রাথমিক ঘনমাত্রা $S_1 = 0.5\text{ M}$

OH^- পরিবর্তিত আয়তন, $V_2 = 11\text{ mL}$


OH^- এর পরিবর্তিত ঘনমাত্রা $S_2 = ?$

$$\therefore K_{\text{ip}} > K_{\text{sp}}$$

প্রশ্ন ১৯ঃ নিম্নের উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



পাত্র-A



পাত্র-B

গ) A পাত্রে Ca^{2+} এর পরিমাণ নির্ণয় কর।

ঘ) A ও B পাত্রের মিশ্রিত দ্রবণের প্রকৃতি দ্রাব্যতার ভিত্তিতে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ২৫ঃ নিম্নের উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

$$75 \text{ mL } 3.5 \times 10^{-2} \text{ M}$$

A_3B_2 দ্রবণ

পাত্র-১

$$125 \text{ mL } 3 \times 10^{-3} \text{ M}$$


XY_2 দ্রবণ

পাত্র-২

AY_2 এর দ্রাব্যতা গুণফল $= 9.148 \times 10^{-7}$

গ) উদ্দীপকের পাত্র-১ এবং পাত্র-২ এর মিশ্রিত দ্রবণে B^{3-} আয়নের ঘনমাত্রা গণনা কর।

ঘ) উদ্দীপকের পাত্র-১ এবং পাত্র-২ এর দ্রবণ মিশ্রিত করলে অধঃক্ষেপ পড়বে কি? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।



$$V_1 S_1 = V_2 S_2$$

$$\therefore S_2 = \frac{V_1 S_1}{V_2} \\ = 0.02625 \text{ M}$$

$$V_1 = 75 \text{ mL}$$


$$V_2 = (75 + 125) \text{ mL} = 200 \text{ mL}$$

$$S_1 = (2 \times 3.5 \times 10^{-2}) \text{ M}$$


$$S_2 = ?$$

৫

ঘ) মিশ্রণের পর,



A^{2+} এর জন্য,



আমরা জানি,


$$V_1S_1 = V_2S_2$$

$$\text{বা, } S_2 = \frac{V_1S_1}{V_2}$$

$$\text{বা, } S_2 = \frac{75 \times 3 \times (3.5 \times 10^{-2})}{200}$$

$$\therefore S_2 = 0.03937 \text{ M}$$

Y^- এর জন্য,




আমরা জানি,

$$V_1S_1 = V_2S_2$$

$$\text{বা, } S_2 = \frac{V_1S_1}{V_2}$$

$$\text{বা, } S_2 = \frac{125 \times 2 \times (3 \times 10^{-3})}{200}$$

$$\therefore S_2 = 3.75 \times 10^{-3} \text{ M}$$



AY_2 এর $K_{ip} = [A^{2+}][Y^-]^2$

$$\text{বা, } K_{ip} = (0.03937) \times (3.75 \times 10^{-3})^2$$

$$K_{ip} = 5.536 \times 10^{-7}$$

$$\text{দেওয়া আছে, } K_{sp} = 9.148 \times 10^{-7}$$

$K_{sp} > K_{ip}$ তাই AY_2 এর অধঃক্ষেপ পড়বে না।

অর্থাৎ অসম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি হয়।

এখানে, মিশ্রণের পূর্বে

A^{2+} এর আয়তন, $V_1 = 75 \text{ mL}$

A^{2+} এর ঘনমাত্রা, $S_1 = 3 \times (3.5 \times 10^{-2}) \text{ M}$

মিশ্রিত দ্রবণের মোট আয়তন, $V_2 = (75 + 125) \text{ mL} = 200 \text{ mL}$

মিশ্রিত দ্রবণের B^{3-} এর ঘনমাত্রা, $S_2 = ?$

এখানে, মিশ্রণের পূর্বে


Y^- এর আয়তন, $V_1 = 125 \text{ mL}$

Y^- এর ঘনমাত্রা, $S_1 = 2 \times (3 \times 10^{-3}) \text{ M}$

মিশ্রিত দ্রবণের মোট আয়তন, $V_2 = (125 + 75) \text{ mL} = 200 \text{ mL}$


মিশ্রিত দ্রবণের Y^- এর ঘনমাত্রা, $S_2 = ?$

* ଅବଶିଷ୍ଟ-ଆୟନ ସମୀକରଣ: (୫)/(୨)



↓
(ଆୟନର ସଂଖ୍ୟା)

ସମୀକରଣ



Ca^{2+} ସମୀକରଣ:

